

ΜΙΝΟΧΙΛ FORTE 5% δερματικό διάλυμα σε σπρέι

Για εξωτερική εφαρμογή σε στεγνά μαλλιά και τριχωτό της κεφαλής.

Διατίθεται χωρίς ιατρική συνταγή	Τοπικό διεγερτικό ανάπτυξης μαλλιών	Μινοξιδίλη 5%
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα κάτω των 18 και άνω των 65 ετών		

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

Ένα μπουκάλι (60 ml) σπρέι περιέχει 3 g μινοξιδίλης.

ΕΚΔΟΧΑ

Προπυλενογλυκόλη, αλκοόλη, καθαρό νερό

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Φιάλη που περιέχει 60 ml διαλύματος

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης, καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες για εσάς.

Αυτό το φάρμακο προορίζεται για τη θεραπεία μιας ήπιας ασθένειας, την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε χωρίς ιατρική συνταγή με τη συμβουλή του φαρμακοποιού σας χωρίς τη βοήθεια γιατρού. Παρόλα αυτά, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Minoxil Forte προσεκτικά για να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα.

Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το ξαναδιαβάσετε αργότερα.

Εάν έχετε περασιπέρω ερωτήσεις, παρακαλούμε ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Αυτό το φάρμακο έχει συνταγογραφηθεί προσωπικά για εσάς, μην το δίνετε σε άλλους.

Όταν επισκέπτεστε γιατρό ή νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτού του φαρμάκου, ενημερώστε τον γιατρό σας ότι χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο.

Ακολουθήστε ακριβώς όσα αναγράφονται σε αυτή την οδηγία. Μην χρησιμοποιείτε **υψηλότερη ή χαμηλότερη** δόση από αυτή που σας συνιστάται για το φάρμακο.

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ:

1. Τι είναι το ΜΙΝΟΧΙΛ FORTE και για ποια χρήση;
2. Τι πρέπει να προσέξετε πριν χρησιμοποιήσετε το ΜΙΝΟΧΙΛ FORTE
3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το ΜΙΝΟΧΙΛ FORTE;
4. Ποιες είναι οι πιθανές παρενέργειες;
5. Αποθήκευση του ΜΙΝΟΧΙΛ FORTE

Τι είναι το ΜΙΝΟΧΙΛ FORTE και για ποια χρήση;

Ένα μπουκάλι ΜΙΝΟΧΙΛ FORTE (60 ml) περιέχει 3 g μινοξιδίλης.

Το ΜΙΝΟΧΙΛ FORTE είναι ένα τοπικό διεγερτικό ανάπτυξης μαλλιών.

Ένα μπουκάλι MINOXIL FORTE (60 ml) περιέχει τη δόση για 30 ημέρες χρήσης. Κάθε ψεκάσμος (0,2 ml) περιέχει 10 mg μινοξιδίου.

ΕΝΔΕΙΞΗ 1

Ανδρογενετική Αλωπεκία (Φαλάκρα)

Χρησιμοποιείται για τη μακροχρόνια θεραπεία, την πρόληψη της τριχόπτωσης και τη διέγερση της ανάπτυξης των μαλλιών.

ΕΝΔΕΙΞΗ 2

Γυροειδής Αλωπεκία

Χρησιμοποιείται για τη διέγερση της ανάπτυξης των μαλλιών.

Τι πρέπει να προσέξετε πριν χρησιμοποιήσετε το MINOXIL FORTE

Αυτό το φάρμακο είναι κατάλληλο για τους περισσότερους ανθρώπους, αλλά ορισμένοι που δεν είναι κατάλληλοι δεν πρέπει να το χρησιμοποιούν. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε το MINOXIL FORTE στις ακόλουθες περιπτώσεις

Εάν είστε υπερευαίσθητοι στη δραστική ουσία μινοξιδίου ή σε οποιοδήποτε από τα συστατικά της σύνθεσης του MINOXIL FORTE.

Εάν δεν είστε σίγουροι αν η τριχόπτωσή σας είναι κληρονομική.

Εάν έχετε τριχόπτωση λόγω φαρμακευτικής αγωγής.

Εάν έχετε ολική φαλάκρα ή ολική απώλεια τριχών σε όλο το σώμα.

Εάν η αιτία της τριχόπτωσής σας είναι άγνωστη ή είναι ξαφνική και απροσδόκητη.

Εάν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση, ακόμα και αν δεν λαμβάνετε θεραπεία.

Εάν έχετε οποιαδήποτε πάθηση που επηρεάζει το τριχωτό της κεφαλής σας, συμπεριλαμβανομένου του ηλιακού εγκαύματος και της ψωρίασης.

Εάν έχετε δερματικές παθήσεις στο τριχωτό της κεφαλής σας, όπως φλεγμονή, ερυθρότητα, μόλυνση, ερεθισμό.

Εάν χρησιμοποιείτε φάρμακο που περιέχει Γουανεθιδίνη.

Εάν είστε κάτω των 18 ετών ή άνω των 65 ετών.

Εάν το τριχωτό της κεφαλής σας έχει ξυριστεί με ξυράφι ή λεπίδα.

Εάν χρησιμοποιείτε κρέμες, αλοιφές ή λοσιόν για τη θεραπεία προβλημάτων του τριχωτού της κεφαλής, όπως στα ακόλουθα παραδείγματα:

Διθρανόλη - χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ψωρίασης.

Τρεπνοΐνη - χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ακμής ή άλλων δερματικών παθήσεων.

Κορτικοστεροειδή - ένας τύπος αντιφλεγμονώδους.

Βαζελίνη - ένα κοινό συστατικό σε κεριά ή gel μαλλιών.

Εάν έχετε οποιοδήποτε επίδεσμο ή επίδεσμο στο τριχωτό της κεφαλής σας.

Εάν δεν γνωρίζετε ότι το τριχωτό της κεφαλής σας είναι φυσιολογικό και υγιές.

Εάν κάποιο από τα παραπάνω ισχύει για εσάς τώρα ή στο παρελθόν, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν χρησιμοποιήσετε το Minoxil Forte.

Εάν δεν είστε σίγουροι για το φάρμακο που λαμβάνετε ή χρησιμοποιείτε, δείξτε το μπουκάλι ή τη συσκευασία στον φαρμακοποιό σας. Εάν κάποιο από τα παραπάνω ισχύει τώρα ή στο παρελθόν, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ Minoxil Forte με προσοχή στις ακόλουθες περιπτώσεις

Εάν δεν είστε σίγουροι αν το τριχωτό της κεφαλής σας είναι φυσιολογικό και υγιές.

Εάν έχετε καρδιακή νόσο, συμπεριλαμβανομένων ανώμαλων καρδιακών ρυθμών ή ταχυκαρδίας, θωρακικών πόνων και/ή κυκλοφορικών διαταραχών.

Εάν λαμβάνετε ή χρησιμοποιείτε άλλο φάρμακο, συμπεριλαμβανομένων:

Ορισμένα φάρμακα για την αρτηριακή πίεση που ονομάζονται "αγγειοδιασταλτικά", π.χ. υδραλαζίνη. Υπάρχει κίνδυνος η μινοξιδίλη, η δραστική ουσία στο Minoxil Forte Spray, να αλληλεπιδράσει με αυτά τα φάρμακα και να αυξήσει τις επιδράσεις τους.

Εάν έχετε ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια.

Εάν έχετε καρδιαγγειακή νόσο.

Εάν χρησιμοποιείτε διουρητικά ή αντιυπερτασικά φάρμακα.

Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε το Minoxil Forte.

Εάν αυτές οι προειδοποιήσεις ισχύουν για εσάς, ακόμα και σε οποιαδήποτε περίοδο του παρελθόντος, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Χρήση του Minoxil Forte με τρόφιμα και ποτά

Δεν υπάρχουν αλληλεπιδράσεις με τρόφιμα και ποτά.

Εγκυμοσύνη

Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν χρησιμοποιήσετε το φάρμακο.

Δεν υπάρχουν επαρκείς μελέτες σε ζώα και έγκυες γυναίκες σχετικά με τη τοπική εφαρμογή μινοξιδίλης. Επομένως, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε έγκυες γυναίκες.

Εάν διαπιστώσετε ότι είστε έγκυος κατά τη διάρκεια της θεραπείας σας, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Θηλασμός

Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν χρησιμοποιήσετε το φάρμακο.

Είναι γνωστό ότι η μινοξιδίλη, ακόμη και σε μικρές ποσότητες, περνά στο γάλα κατά την τοπική εφαρμογή.

Λόγω πιθανών παρενεργειών, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του θηλασμού.

Οδήγηση και χρήση μηχανημάτων

Το Minoxil Forte μπορεί να προκαλέσει ζάλη ή χαμηλή αρτηριακή πίεση. Λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα εμφάνισης αυτών των παρενεργειών, μην οδηγείτε οχήματα ή χρησιμοποιείτε μηχανήματα.

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ορισμένα έκδοχα του Minoxil Forte

Η αλκοόλη που περιέχεται στο Minoxil Forte μπορεί να προκαλέσει αίσθημα καύσου και ερεθισμό εάν έρθει σε επαφή με τα μάτια, τους βλεννογόνους ή ευαίσθητες ή τραυματισμένες περιοχές του δέρματος. Εάν έρθει σε επαφή με τέτοιες περιοχές, η περιοχή επαφής πρέπει να πλυθεί με άφθονο κρύο νερό.

Η προπυλενογλυκόλη που περιέχεται στο Minoxil Forte μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος.

Ειδικές προειδοποιήσεις σχετικά με το Minoxil Forte

Η τοπική μινοξιδίλη ενδείκνυται για τη μακροχρόνια θεραπεία της ανδρογενετικής αλωπεκίας, χρησιμοποιείται για την πρόληψη της τριχόπτωσης, τη διέγερση της ανάπτυξης των μαλλιών και τη διέγερση της ανάπτυξης των μαλλιών στη θεραπεία της γυροειδούς αλωπεκίας (ξαφνική τριχόπτωση σε περιοχές). Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους τύπους τριχόπτωσης. Η τοπική μινοξιδίλη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν δεν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό τριχόπτωσης, εάν η τριχόπτωση είναι ξαφνική ή/και σε μορφή μπαλωμάτων, εάν η τριχόπτωση είναι από τη γέννηση ή εάν η αιτία της τριχόπτωσης είναι άγνωστη.

Εάν η μινοξιδίλη εισέλθει στην κυκλοφορία του αίματος, μπορεί να προκαλέσει ορισμένες παρενέργειες που σχετίζονται με χαμηλή αρτηριακή πίεση, όπως πόνος στο στήθος, γρήγορο καρδιακό παλμό, λιποθυμία, ζάλη, οίδημα στα χέρια και τα πόδια, συνεχή ερυθρότητα ή ερεθισμό του τριχωτού της κεφαλής. Εάν εμφανίσετε οποιαδήποτε από αυτές τις παρενέργειες, διακόψτε τη χρήση του φαρμάκου και ενημερώστε τον γιατρό σας. Όταν το Minoxil Forte χρησιμοποιείται όπως συνιστάται, η πιθανότητα εμφάνισης αυτών των επιδράσεων είναι εξαιρετικά χαμηλή. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιηθεί υπερβολικά ή εάν υπάρχει πάθηση του τριχωτού της κεφαλής, όπως ψωρίαση, υπάρχει πιθανότητα το φάρμακο να εισέλθει στην κυκλοφορία του αίματος. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιείτε το φάρμακό σας όπως συνιστάται και να ακολουθείτε πολύ προσεκτικά τις οδηγίες.

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια, το στόμα, το σκασμένο δέρμα και τις ευαίσθητες περιοχές. Εάν το διάλυμα εφαρμοστεί κατά λάθος σε περιοχές του σώματος εκτός του τριχωτού της κεφαλής, ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό.

Μην εφαρμόζετε σε περιοχές του σώματος εκτός του τριχωτού της κεφαλής.

Η υπέρβαση της συνιστώμενης δόσης ΔΕΝ θα επιταχύνει την ανάπτυξη των μαλλιών σας και θα αυξήσει την πιθανότητα εμφάνισης παρενεργειών.

Η τυχαία κατάποση μπορεί να προκαλέσει σοβαρές καρδιακές παρενέργειες. Επομένως, αυτό το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Ορισμένοι ασθενείς έχουν παρουσιάσει αλλαγές στο χρώμα και/ή στην υφή των μαλλιών κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος.

Ορισμένοι καταναλωτές έχουν αναφέρει αυξημένη τριχόπτωση με την έναρξη της θεραπείας με μινοξιδίλη. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στο ότι η μινοξιδίλη μετατοπίζει τα μαλλιά από τη φάση ανάπαυσης στη φάση ανάπτυξης (τα παλιά μαλλιά πέφτουν καθώς αναπτύσσονται νέα μαλλιά στη θέση τους). Αυτή η προσωρινή αύξηση της τριχόπτωσης εμφανίζεται συνήθως δύο έως έξι εβδομάδες μετά την έναρξη της θεραπείας και υποχωρεί εντός λίγων εβδομάδων. Εάν η τριχόπτωση επιμείνει (> 2 εβδομάδες), οι χρήστες πρέπει να διακόψουν τη χρήση του Minoxil Forte και να συμβουλευτούν τον γιατρό τους. Οι χρήστες πρέπει να το γνωρίζουν αυτό κατά τη μακροχρόνια χρήση του Minoxil Forte και να συμβουλευτούν τον γιατρό τους.

Χρήση με άλλα φάρμακα

Εάν χρησιμοποιείτε διουρητικό ή άλλο αντιυπερτασικό φάρμακο, μην το χρησιμοποιείτε χωρίς να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Εάν χρησιμοποιείτε αντιυπερτασικό φάρμακο γνωστό ως "Γουανεθιδίνη", μην χρησιμοποιείτε το Minoxil Forte.

Μην χρησιμοποιείτε το Minoxil Forte μαζί με άλλα φάρμακα που εφαρμόζονται στο τριχωτό της κεφαλής.

Εάν χρησιμοποιείτε ή έχετε χρησιμοποιήσει πρόσφατα οποιοδήποτε άλλο φάρμακο, συνταγογραφούμενο ή μη, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας σχετικά.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Minoxil Forte;

Το Minoxil Forte προορίζεται μόνο για τοπική (επιφανειακή) και εξωτερική χρήση. Πρέπει να εφαρμόζεται μόνο απευθείας στο τριχωτό της κεφαλής.

Οδηγίες για τη σωστή χρήση και τη συχνότητα δόσεων/εφαρμογής:

Εφαρμόστε το Minoxil Forte στην περιοχή της τριχόπτωσης· 5 ψεκασμούς (1 ml) δύο φορές την ημέρα, πρωί και βράδυ.

Μην χρησιμοποιείτε το Minoxil Forte σε κανένα άλλο μέρος του σώματός σας εκτός από τα στεγνά μαλλιά και το τριχωτό της κεφαλής.

Εάν έρθει ακούσια σε επαφή με περιοχή εκτός από τα στεγνά μαλλιά και το τριχωτό της κεφαλής, ξεπλύνετε την περιοχή με άφθονο νερό.

Η χρήση του Minoxil Forte πρέπει να διακοπεί 24 ώρες πριν από οποιοδήποτε χημικές επεξεργασίες μαλλιών (βαφή, περμανάντ κ.λπ.).

Το σπρέι μαλλιών, το gel, το σαμπουάν ή άλλα παρόμοια προϊόντα μαλλιών με χημικά συστατικά πρέπει να χρησιμοποιούνται τουλάχιστον 30 λεπτά μετά την εφαρμογή του Minoxil Forte.

Τα αντηλιακά μπορούν να μειώσουν την αποτελεσματικότητα του Minoxil Forte, επομένως πρέπει να χρησιμοποιούνται τουλάχιστον 4 ώρες μετά την εφαρμογή του Minoxil Forte στο τριχωτό της κεφαλής.

Μην διακόπτετε τη θεραπεία νωρίς, καθώς το Minoxil Forte χρησιμοποιείται μακροπρόθεσμα για την πρόληψη της τριχόπτωσης και την ανάπτυξη των μαλλιών. Η ανάπτυξη των μαλλιών παρατηρείται μετά από 4 έως 6 μήνες συνεχούς εφαρμογής, με μέγιστο αποτέλεσμα στο τέλος των 12 μηνών.

Μην ξεχνάτε να χρησιμοποιείτε το φάρμακό σας στην ώρα του.

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες, εκτός εάν ο γιατρός σας έχει δώσει διαφορετική συμβουλή.

Τρόπος και μέθοδος εφαρμογής:

Ψεκάστε το Minoxil Forte στην περιοχή της τριχόπτωσης μία φορά και απλώστε το κάνοντας μασάζ με τα δάχτυλά σας.

Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία 5 φορές και μετά πλύνετε καλά τα χέρια σας.

Μην υπερβαίνετε τους 5 ψεκασμούς (1 ml) ανεξάρτητα από το μέγεθος της περιοχής.

Ένα μπουκάλι Minoxil Forte περιέχει τη δόση για 30 ημέρες χρήσης.

Το Minoxil Forte εφαρμόζεται εξωτερικά. Μην το χρησιμοποιείτε από το στόμα ή αναπνευστικά και μην το πίνετε.

Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης μινοξιδίλης, είναι πιθανή η εμφάνιση ενός καρδιαγγειακού πίνακα που χαρακτηρίζεται από κατακράτηση υγρών και ταχυκαρδία. Σε μια τέτοια περίπτωση, η κατακράτηση υγρών μπορεί να διορθωθεί με κατάλληλη διουρητική θεραπεία. Η κλινικά σημαντική ταχυκαρδία μπορεί να ελεγχθεί με β-αναστολέα (φάρμακο που μειώνει την αρτηριακή πίεση). Σε περίπτωση ανάπτυξης χαμηλής αρτηριακής πίεσης (υπότασης), πρέπει να αντιμετωπιστεί με αναπλήρωση υγρών. Φάρμακα όπως η νορεπινεφρίνη και η επινεφρίνη πρέπει να αποφεύγονται λόγω των υπερβολικών διεγερτικών επιδράσεών τους στην καρδιά. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο αντίδοτο.

Εάν έχετε την εντύπωση ότι η επίδραση του Minoxil Forte είναι πολύ ισχυρή ή πολύ αδύναμη, μιλήστε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Διαφορετικές ηλικιακές ομάδες

Χρήση σε παιδιά:

Δεν χρησιμοποιείται σε παιδιά κάτω των 18 ετών.

Χρήση σε ηλικιωμένους:

Δεν χρησιμοποιείται σε άτομα άνω των 65 ετών

Ειδικές περιπτώσεις χρήσης:

Νεφρική/Ηπατική ανεπάρκεια:

Λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα επηρεασμού του μεταβολισμού του φαρμάκου ή της νεφρικής απέκκρισης σε ασθενείς με ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια, αυτοί οι ασθενείς δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το Minoxil Forte χωρίς να συμβουλευτούν γιατρό.

Εάν χρησιμοποιήσατε περισσότερο Minoxil Forte από όσο έπρεπε:

Εάν έχετε χρησιμοποιήσει περισσότερο Minoxil Forte από όσο έπρεπε, μιλήστε με έναν γιατρό ή φαρμακοποιό. Εάν έχετε χρησιμοποιήσει περισσότερο φάρμακο από όσο χρειάζεται (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών), μεταβείτε αμέσως σε κέντρο υγείας, παίρνοντας μαζί σας το φάρμακο και τη συσκευασία του.

Εάν ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το Minoxil Forte:

Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.

Εάν ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το Minoxil Forte, χρησιμοποιήστε την κανονική δόση την επόμενη ημέρα.

Επιδράσεις που μπορεί να εμφανιστούν όταν διακοπεί η θεραπεία με Minoxil Forte

Όταν διακοπεί η θεραπεία, το όφελος της θεραπείας εξαφανίζεται και η τριχόπτωση επανέρχεται.

Ποιες είναι οι πιθανές παρενέργειες;

Όπως όλα τα φάρμακα, το Minoxil Forte μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες σε άτομα που είναι ευαίσθητα στα συστατικά του.

Πολύ συχνές: Μπορεί να εμφανιστούν σε τουλάχιστον 1 στους 10 ασθενείς.

Συχνές: Μπορεί να εμφανιστούν σε λιγότερο από 1 στους 10, αλλά σε περισσότερους από 1 στους 100 ασθενείς.

Όχι συχνές: Μπορεί να εμφανιστούν σε λιγότερο από 1 στους 100, αλλά σε περισσότερους από 1 στους 1000 ασθενείς.

Σπάνιες: Μπορεί να εμφανιστούν σε λιγότερο από 1 στους 1000, αλλά σε περισσότερους από 1 στους 10000 ασθενείς.

Πολύ σπάνιες: Μπορεί να εμφανιστούν σε λιγότερο από 1 στους 10000 ασθενείς.

Άγνωστες: Δεν μπορούν να εκτιμηθούν από τα διαθέσιμα δεδομένα.

Εάν συμβεί κάποιο από τα ακόλουθα, διακόψτε τη χρήση του Minoxil Forte και ενημερώστε ΑΜΕΣΑ τον γιατρό σας ή μεταβείτε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του πλησιέστερου νοσοκομείου:

Ξαφνικά σημάδια αλλεργίας, π.χ. οίδημα στα χέρια, πόδια, αστραγάλους, πρόσωπο, χείλη ή ιδιαίτερα οίδημα στο στόμα ή το λαιμό που δυσκολεύει την κατάποση ή την αναπνοή, δερματικό εξάνθημα (κνίδωση), ξαφνική πτώση της αρτηριακής πίεσης (υπόταση), πόνος στο στήθος.

Όλα αυτά είναι πολύ σοβαρές παρενέργειες. Εάν κάποιο από αυτά εμφανιστεί σε εσάς, σημαίνει ότι έχετε σοβαρή αλλεργία στο Minoxil Forte. Μπορεί να χρειαστείτε επείγουσα ιατρική παρέμβαση ή νοσηλεία.

Εάν παρατηρήσετε κάποιο από τα ακόλουθα, ενημερώστε αμέσως τον γιατρό σας ή συμβουλευτείτε το τμήμα επειγόντων περιστατικών του πλησιέστερου νοσοκομείου ή τον γιατρό σας:

Πόνος στο στήθος (στηθάγχη).

Αλλαγές στον καρδιακό σας παλμό (επιτάχυνση ή επιβράδυνση).

Δυσκολία στην αναπνοή (ειδικά όταν βρίσκεστε σε ύπτια θέση).

Ανεξήγητη ταχεία αύξηση βάρους.

Λιγότερη ούρηση από πριν.

Αλλεργικές αντιδράσεις όπως οίδημα στο πρόσωπο, ερυθρότητα ή κνησμός του δέρματος ή αίσθημα πνιγμού.

Χαμηλή αρτηριακή πίεση.

Γρήγορος καρδιακός παλμός ή αίσθημα του καρδιακού παλμού (ταχυκαρδία).

Λιποθυμία ή ζάλη.

Οίδημα στα χέρια ή τα πόδια, δύσπνοια.

Ξαφνική ανεξήγητη αύξηση βάρους.

Επίμονη τοπική ερυθρότητα ή εξάνθημα.

Όλα αυτά είναι σοβαρές παρενέργειες. Μπορεί να χρειαστεί επείγουσα ιατρική παρέμβαση. Σοβαρές παρενέργειες είναι πολύ σπάνιες.

Εάν παρατηρήσετε κάποιο από τα ακόλουθα, ενημερώστε τον γιατρό σας:

Αυτές οι παρενέργειες παρατίθενται κατά συχνότητα.

Πολύ συχνές

Πονοκέφαλος.

Συχνές

Αντιδράσεις υπερευαισθησίας.

Κνησμός (συμπεριλαμβανομένου γενικευμένου κνησμού εξανθήματος και κνησμού στα μάτια).

Εξάνθημα.

Έκζεμα (δερματίτιδα).

Ανεπιθύμητη τριχοφυΐα εκτός του τριχωτού της κεφαλής έχει αναφερθεί (συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης τριχών στο πρόσωπο στις γυναίκες). Πάντα να πλένετε καλά τα χέρια σας μετά την εφαρμογή και να ξεπλένετε καλά με άφθονο νερό εάν εφαρμοστεί κατά λάθος διάλυμα σε περιοχές του σώματος εκτός του τριχωτού της κεφαλής.

Αύξηση βάρους.

Οίδημα προσώπου.

Γενικευμένη ερυθρότητα, γενικός κνησμός.

Οίδημα προσώπου και αίσθημα πνιγμού στο λαιμό.

Οίδημα σώματος.

Πόνος στο στήθος.

Όχι συχνές

Ναυτία.

Ζάλη.

Ταχυκαρδία.

Δυσκολία στην αναπνοή.

Σπάνιες

Μπορεί να συμβεί αλλαγή στην υφή των μαλλιών. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να διακόψετε τη χρήση του MINOXIL FORTE.

Άγνωστες

Οίδημα χειλιών, πρήξιμο χειλιών, οίδημα στόματος, πρήξιμο λαιμού, πρήξιμο γλώσσας και οίδημα γλώσσας (αγγειοοίδημα).

Αυξημένος καρδιακός ρυθμός.

Χαμηλή αρτηριακή πίεση (υπόταση).

Κατάθλιψη.

Ερεθισμός των ματιών.

Εμετός.

Έχουν αναφερθεί όλοι οι ερεθισμοί του τριχωτού της κεφαλής, όπως τοπική ερυθρότητα, ξηρότητα, ξεφλούδισμα. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην προπυλενογλυκόλη του προϊόντος. Αυτό είναι συνήθως μόνο ένα προσωρινό αποτέλεσμα, αλλά εάν επιμείνει, πρέπει να διακόψετε τη χρήση αυτού του προϊόντος.

Ακνεικό εξάνθημα, κνησμώδες εξάνθημα, φουσκάλες, αιμορραγία ή ελκώσεις.

Προσωρινή τριχόπτωση μπορεί να συμβεί κατά τις πρώτες 2-6 εβδομάδες χρήσης. Αυτό είναι πιθανώς αποτέλεσμα μιας αλλαγής στον κύκλο ανάπτυξης και θα πρέπει να σταματήσει μέσα σε λίγες εβδομάδες. Εάν αυτή η τριχόπτωση διαρκέσει περισσότερο από δύο εβδομάδες, διακόψτε τη χρήση του προϊόντος και μιλήστε με τον γιατρό σας.

Μπορεί να υπάρξει αλλαγή στο χρώμα των μαλλιών. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να διακόψετε τη χρήση του Minoxil Forte Spray.

Ξηρότητα του δέρματος.

Απολέπιση.

Ερεθισμός και κάψιμο του δέρματος.

Έκζεμα.

Σχηματισμός κρούστας.

Αντιδράσεις στην περιοχή εφαρμογής (μερικές φορές περιλαμβάνουν περιοχές κοντά στην περιοχή εφαρμογής, όπως το αυτί και το πρόσωπο. Τυπικά μπορεί να εμφανιστούν εξανθήματα όπως κνησμός, ερεθισμός, πόνος, ερυθρότητα, οίδημα, ξηρό δέρμα, αλλά μερικές φορές μπορεί να είναι πιο σοβαρές και μπορεί να παρατηρηθούν απολέπιση, έκζεμα, φουσκάλες, αιμορραγία και ελκώσεις.

Αυτές είναι ήπιες παρενέργειες του MINOXIL FORTE.

Εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε παρενέργεια που δεν αναφέρεται σε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Αναφορά παρενεργειών



Σε περίπτωση εμφάνισης οποιασδήποτε παρενέργειας, είτε αναφέρεται είτε όχι στο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης, μιλήστε με τον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τη νοσοκόμα σας. Επίσης, αναφέρετε τις παρενέργειες που αντιμετωπίζετε στο Τουρκικό Κέντρο Φαρμακοεπαγρύπνησης (TÜFAM) καλώντας τη γραμμή αναφοράς παρενεργειών 0 800 314 00 08 ή κάνοντας κλικ στο εικονίδιο "Αναφορά Παρενέργειας Φαρμάκου" στον ιστότοπο www.titck.gov.tr. Με την αναφορά των παρενεργειών, θα συμβάλετε στην παροχή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του φαρμάκου που χρησιμοποιείτε.

Αποθήκευση του MİNOXİL FORTE

Φυλάσσετε το MİNOXİL FORTE μακριά από τα μάτια και την προσιτότητα των παιδιών, στην αρχική του συσκευασία.

Φυλάσσετε σε θερμοκρασία δωματίου κάτω των 25°C, σε ξηρό μέρος και προστατευμένο από το φως.

Μακριά από υπερβολική θερμότητα και φωτιά.

Χρησιμοποιήστε σύμφωνα με την ημερομηνία λήξης.

Μην χρησιμοποιείτε το MİNOXİL FORTE μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.

«Μην πετάτε τα φάρμακα που έχουν λήξει ή δεν χρησιμοποιούνται στα σκουπίδια! Δώστε τα στο σύστημα συλλογής που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Αστικοποίησης και Κλιματικής Αλλαγής.»

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας:

Humanis Sağlık A.Ş. Maslak/Sarıyer/İstanbul

Τόπος παραγωγής:

Humanis Sağlık A.Ş. Karaklı/Tekirdağ

Αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε στις