

# ETOTiO 400 ملغ/8 ملغ أقراص مغلقة

يؤخذ عن طريق الفم. رقم الترخيص: - :ATC -

لا يستخدم لمن هم دون 18 عامًا	مضادات الالتهاب غير الستيرويدية	مرخي للعضلات	بوصفة طبية
-------------------------------	---------------------------------	--------------	------------

## المواد الفعالة والمساعدة

**المادة الفعالة:** يحتوي كل قرص مغلف على 400 ملغ إيتودولاك و 8 ملغ ثيوكولشيكوزيد.

**المواد المساعدة:** في القرص الأساسي: لانتوز أحادي الهيدرات (مستخلص من حليب البقر)، سليلوز بلوري دقيق، نشا الصوديوم جليكولات، ثاني أكسيد السيليكون الغروي، بولي فينيل بيروليدون، ستيرات المغنيسيوم. في الطبقة المغلقة: هيدروكسي بروبيل ميثيل سليلوز، ثاني أكسيد التيتانيوم، بولي إيثيلين جلايكول 400.

**العبوة:** يقدم في علب كرتونية تحتوي على عبوات بليستر تحوي 14 قرصًا مغلفًا.

قبل البدء في استخدام هذا الدواء، اقرأ هذه النشرة بعناية، لأنها تحتوي على معلومات مهمة لك.

احتفظ بهذه النشرة. قد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى لاحقًا.

إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية، يرجى استشارة طبيبك أو الصيدلي.

هذا الدواء موصوف لك شخصيًا، لا تعطيه للآخرين.

أثناء استخدام هذا الدواء، أخبر طبيبك أنك تستخدم هذا الدواء عند زيارة الطبيب أو المستشفى.

اتبع ما هو مكتوب في هذه النشرة حرفيًا. لا تستخدم جرعة أعلى أو أقل من الجرعة الموصى بها لك بخصوص الدواء.

## في هذه النشرة:

1. ما هو ETOTiO وما هي دواعي استعماله؟

2. ما يجب معرفته قبل استخدام ETOTiO

3. كيفية استخدام ETOTiO؟

4. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

5. تخزين ETOTiO

## ما هو ETOTiO وما هي دواعي استعماله؟

ETOTiO هو قرص مغلف بيضوي الشكل أبيض أو أبيض مصفر يحتوي على إيتودولاك و ثيوكولشيكوزيد كمواد فعالة.

يقدم ETOTiO في عبوات بليستر تحتوي على 14 قرصًا مغلفًا داخل علبة كرتونية.

### دواعي الاستعمال 1

التهاب المفاصل العظمي (الخشونة)

### دواعي الاستعمال 2

متلازمات العمود الفقري المؤلمة

دواعي الاستعمال 3  
الروماتيزم خارج المفصل

دواعي الاستعمال 4  
في العلاج العرضي للتشنجات العضلية المؤلمة

دواعي الاستعمال 5  
الآلام الناتجة عن الصدمات والجراحة

## ما يجب معرفته قبل استخدام ETOTiO

### لا تستخدم ETOTiO في الحالات التالية:

- إذا كان لديك حساسية تجاه إيتودولاك، ثيوكولشيكوزيد أو أي من المكونات المساعدة الأخرى الموجودة في ETOTiO.
- إذا عانيت من رد فعل تحسسي شديد تجاه الأسبرين أو أي دواء آخر من مجموعة إيتودولاك (مثل الإيبوبروفين، السيليكوكسيب) (مثل طفح جلدي شديد، شرى، صعوبة في التنفس، تورم في الأنف بسبب الحساسية مع تضيق الشعب الهوائية، دوخة).
- إذا كان لديك قرحة أو نزيف في المعدة أو الأمعاء، أو عانيت منها سابقًا.
- إذا كان لديك نزيف أو انثقاب في الجهاز الهضمي مرتبط بمضادات الألم سابقًا.
- إذا كنت تعاني من فشل حاد في القلب، الكلى أو الكبد.
- قد يؤدي إلى زيادة خطر حدوث مشاكل خطيرة في القلب والأوعية الدموية قد تكون قاتلة (مثل النوبة القلبية). قد يكون هذا الخطر أعلى إذا كنت تعاني من مشاكل في القلب، أو فشل في القلب، أو تناول إيتودولاك لفترة طويلة. إذا خضعت مؤخرًا لجراحة تحويل مسار الشريان التاجي أو ستخضع لها قريبًا.
- إذا كنت حاملًا أو مرضعة.
- إذا كنت تعاني من ضعف أو عدم قدرة العضلات على العمل (عدم الانقباض).
- إذا كنت محتملة الحمل ولا تستخدمين وسيلة فعالة لتحديد النسل.
- إذا كنت دون سن 18 عامًا.

### استخدم ETOTiO بحذر في الحالات التالية:

**المخاطر المتعلقة بالجهاز القلبي الوعائي:** قد تزيد مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) من خطر الحوادث التخثرية (الجلطات)، والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية التي قد تكون قاتلة. قد يزداد هذا الخطر مع مدة الاستخدام. قد يكون الخطر أعلى لدى المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية أو عوامل خطر أمراض القلب والأوعية الدموية. لا ينبغي استخدام ETOTiO لعلاج الألم قبل جراحة مجازة الشريان التاجي.

**المخاطر المتعلقة بالجهاز الهضمي:** قد تسبب مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) آثارًا جانبية خطيرة قد تكون قاتلة مثل النزيف، تكون القرحة، أو انثقاب المعدة أو الأمعاء. قد تظهر هذه الآثار الجانبية في أي وقت، مع أو بدون علامات تحذير مسبقة. المرضى المسنون أكثر عرضة لهذه الآثار الخطيرة. توقف عن استخدام الدواء عند ظهور أعراض نزيف في الجهاز الهضمي، أو قرحة، أو انثقاب.

إذا كنت تتناول أي أدوية موصوفة أو بدون وصفة طبية، أو منتجات عشبية، أو مكملات غذائية، أو أي مدرات بول أخرى.

إذا كان لديك حساسية تجاه الأدوية، الأطعمة، أو المواد الأخرى.

إذا كان لديك تاريخ من أمراض الكلى أو الكبد، أو مرض السكري، أو مشاكل في المعدة أو الأمعاء.

إذا كان لديك تورم أو احتباس سوائل، أو مرض جلدي يسمى الذئبة والذي يظهر على شكل التهاب في الشعيرات الدموية في الأنف/الخدخين، ويقع حمراء كبيرة على الجلد، أو الربو، أو تورم في الأنف بسبب الحساسية، أو التهاب في الفم.

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، أو اضطرابات الدم، أو مشاكل في النزيف أو التخثر، أو مشاكل في القلب (مثل فشل القلب)، أو أمراض القلب والأوعية الدموية، أو معرضًا لخطر الإصابة بأي من هذه الأمراض.

إذا كانت صحتك سيئة، أو تعاني من الجفاف (نقص السوائل)، أو انخفاض حجم السوائل، أو انخفاض مستويات الصوديوم في الدم، أو تناول الكحول، أو لديك تاريخ من تعاطي الكحول.

إذا كان لديك مشاكل مثل الربو أو صعوبة في التنفس.

إذا كنت مصابًا بالصرع أو معرضًا لخطر نوبات الصرع.

عند استخدام المادة الفعالة ثيوكولشيكوزيد الموجودة في ETOTiO، قد تتسبب إحدى المواد التي تتكون في الجسم في تلف بعض الخلايا (عدد كروموسومات غير طبيعي) عند استخدام ثيوكولشيكوزيد بجرعات عالية. وقد ثبت ذلك في الدراسات التي أجريت على الحيوانات وفي المختبر. هذا التلف الذي قد يحدث في الخلايا البشرية يشكل عامل خطر للسرطان، وقد يضر بالجنين، وقد يسبب العقم لدى الرجال. لذلك، اتبع بدقة الجرعة ومدة العلاج المذكورة في قسم "تعليمات الاستخدام والجرعة/تكرار الاستخدام المناسب". لا تستخدم الدواء بجرعات أعلى أو لأكثر من 7 أيام. إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى، يرجى استشارة طبيبك.

إذا لاحظت أي علامات تدل على تلف الكبد (مثل فقدان الشهية، الغثيان، القيء، عدم الراحة في البطن، التعب، البول الداكن، اليرقان، الحكة) أثناء العلاج بـ ETOTiO، يجب عليك التوقف عن استخدام ETOTiO فورًا وطلب المساعدة الطبية إذا ظهرت أي من هذه الأعراض.

إذا ظهر إسهال أثناء العلاج، توقف عن العلاج بـ ETOTiO.

إذا كانت هذه التحذيرات تنطبق عليك، حتى لو كانت في أي وقت مضى، يرجى استشارة طبيبك.

## استخدام ETOTiO مع الطعام والشراب

لا تتناول ETOTiO مع الكحول، فقد يزيد ذلك من خطر تلف المعدة. يمكن استخدام ETOTiO مع الطعام والمشروبات.

## الحمل

*استشر طبيبك أو الصيدلي قبل استخدام الدواء.*

لا تتناول هذا الدواء إذا كنت حاملاً، أو من المحتمل أن تصحي حاملاً، أو تعتقدين أنك قد تكونين حاملاً.

لا تتناولي هذا الدواء إذا كنت امرأة في سن الإنجاب ولا تستخدمين وسيلة لتحديد النسل.

قد يضر هذا الدواء بجنينك.

قد يسبب هذا الدواء مشاكل في خصوبة الذكور بسبب احتمال تلف خلايا الحيوانات المنوية (عدد غير طبيعي من الكروموسومات). يعتمد هذا الاكتشاف على دراسات مخبرية (انظر القسم 2 "التحذيرات والاحتياطات").

*إذا لاحظت أنك حامل أثناء العلاج، استشير طبيبك فورًا.*

## الرضاعة

*استشر طبيبك أو الصيدلي قبل استخدام الدواء.*

لا تستخدم هذا الدواء إذا كنت ترضعين. والسبب في ذلك هو أن الدواء ينتقل إلى حليب الأم.

## القيادة واستخدام الآلات

قد يسبب ETOTiO الدوخة أو النعاس. قد تسوء هذه الآثار عند تناوله مع الكحول أو بعض الأدوية. وفقًا للدراسات السريرية، ليس لثيوكولشيكوزيد تأثير على الأداء الحركي النفسي (الذي يعتمد على النشاط العقلي). ومع ذلك، بما أن الدواء قد يسبب النعاس والدوخة بشكل شائع، توخ الحذر عند قيادة المركبات أو تشغيل الآلات. لا تقود السيارة أو تقوم بأعمال أخرى قد تكون خطيرة حتى

## معلومات هامة حول بعض المكونات المساعدة في ETOTiO

إذا كان لديك رد فعل (تفاعل) سابق تجاه ETOTiO أو أي من مكوناته، فلا تستخدم هذا الدواء. يحتوي كل قرص من ETOTiO على 250 ملغ من اللاكتوز أحادي الهيدرات (المستخلص من حليب البقر). إذا أخبرك طبيبك سابقًا بأن لديك عدم تحمل لبعض السكريات، فاتصل بطبيبك قبل تناول هذا المنتج الطبي.

## استخدام أدوية أخرى مع ETOTiO

إذا كنت تتناول أي دواء، خاصةً أي من الأدوية التالية، أخبر طبيبك:

الأدوية التي تمنع أو تؤخر تخثر الدم (مضادات التخثر، على سبيل المثال، الوارفارين، الأدوية المحتوية على الهيبارين)، الأسبرين، الكورتيكوستيرويدات (على سبيل المثال، الأدوية المحتوية على بريدنيزون)، الأدوية المحتوية على فلوكستين المستخدمة في علاج الاكتئاب [مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRIs)]. قد يزيد خطر نزيف المعدة عند تناول هذه الأدوية معًا.

قد يزداد خطر الآثار الجانبية لـ ETOTiO عند استخدام الأدوية المحتوية على فينيل بوتازون (مضاد للالتهاب يستخدم خاصة في حالات الروماتيزم) أو بروفينسيد (يستخدم في علاج النقرس عن طريق زيادة إفراز حمض اليوريك).

المجموعات والأدوية التي قد تزداد فعاليتها عند استخدامها مع ETOTiO هي: السيكلوسبورين المستخدم في زراعة الأعضاء؛ الديجوكسين المستخدم في مشاكل القلب؛ الليثيوم المستخدم في علاج بعض الاضطرابات المزاجية؛ الميثوتريكسات المستخدم في حالات مثل التهاب المفاصل الروماتويدي (مرض مزمن يسبب الألم وتغير شكل المفاصل) أو الصدفة، الكينولونات (على سبيل المثال، الأدوية المحتوية على سيبروفلوكساسين) أو السلفونيل يوريا (على سبيل المثال، الأدوية المحتوية على جليبيزيد).

المجموعات والأدوية التي قد تنخفض فعاليتها عند استخدامها مع ETOTiO: مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE) (على سبيل المثال، الأدوية المحتوية على إينالابريل) أو مدرات البول (على سبيل المثال، الأدوية المحتوية على فوروسيميد، هيدروكلوروثيازيد).

أثناء استخدام ETOTiO، لا تتناول الإيبوبروفين، النابروكسين، الديكلوفيناك، أو غيرها من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs)، الميفبريستون (يستخدم لإنهاء الحمل)، الأسبرين دون استشارة طبيبك.

لا يُنصح بتناول ETOTiO مع الأدوية الأخرى التي لها تأثير مرخي للعضلات على الجهاز العصلي الهيكلي، حيث قد تزيد من تأثير بعضها البعض. لنفس السبب، عند استخدامه مع دواء آخر يؤثر على العضلات الملساء، يجب توخي الحذر من زيادة احتمالية ظهور الآثار الجانبية غير المرغوبة.

تذكر أن هذا التحذير قد ينطبق أيضًا على المنتجات التي تم استخدامها في فترة معينة سابقًا أو التي سيتم استخدامها في المستقبل.

إذا كنت تستخدم حاليًا أي دواء بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية، أو استخدمته مؤخرًا، يرجى إبلاغ طبيبك أو الصيدلي بذلك.

## كيفية استخدام ETOTiO؟

### تعليمات الاستخدام والجرعة/تكرار الاستخدام المناسب:

الجرعة الموصى بها والجرعة اليومية القصوى هي قرص واحد مغلف مرتين يوميًا، تؤخذ كل 12 ساعة. أي، لا تستخدم أكثر من قرصين من ETOTiO في اليوم الواحد. لا تستخدم الدواء لأكثر من 7 أيام متتالية.

### طريقة التطبيق:

ETOTiO للاستخدام الفموي فقط. لا تمضغ الأقراص المغلفة. تناول الأقراص مع كمية كافية من الماء (على سبيل المثال، كوب من الماء) بعد الوجبات. لا تتجاوز الجرعة الموصى بها وتجنب الاستخدام طويل الأمد.

اتبع هذه التعليمات ما لم يوصي طبيبك بخلاف ذلك. لا تنس تناول دوائك في الوقت المحدد.

سيخبرك طبيبك بمدى علاجك بـ ETOTiO. لا توقف العلاج مبكرًا لأنك لن تحصل على النتيجة المرجوة.

### الفئات العمرية المختلفة

## الاستخدام في الأطفال:

لا تستخدم هذا الدواء في الأطفال دون سن 18 عامًا.

## الاستخدام في كبار السن:

يجب استخدامه بحذر في كبار السن، حيث قد يكونون أكثر عرضة لنزيف المعدة ومشاكل الكلى.

## حالات الاستخدام الخاصة:

### اختلال وظائف الكلى/الكبد:

لم يتم دراسة السلامة والفعالية في المرضى الذين يعانون من اختلال وظائف الكلى/الكبد. لا ينبغي استخدامه في حالات الفشل الكبدى والكلى الشديد.

إذا كان لديك انطباع بأن تأثير ETOTiO قوي جدًا أو ضعيف جدًا، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي.

## إذا استخدمت كمية أكبر مما يجب من ETOTiO:

قد تشمل الأعراض (العلامات): انخفاض في إخراج البول، صداع، غثيان، قيء، ألم في البطن، نزيف في الجهاز الهضمي (قد يكون البراز الداكن أو الدموي أو القيء الذي يشبه حبيبات القهوة علامة على النزيف)، إسهال نادرًا، فرط استثارة (هياج)، غيبوبة، دوخة، نعاس، طنين في الأذنين، شعور بالإغماء، تشنجات في حالات نادرة جدًا، وصعوبة في التنفس.

إذا استخدمت كمية أكبر مما يجب من ETOTiO، تحدث إلى الطبيب أو الصيدلي.

## إذا نسيت استخدام ETOTiO:

إذا فاتتك جرعة من ETOTiO وتناولته بانتظام، فتناول الجرعة الفائتة في أقرب وقت ممكن. إذا كان موعد الجرعة التالية قد اقترب تقريبًا، فتجاوز الجرعة الفائتة. ثم استمر في تناوله بانتظام.

لا تتناول جرعة مضاعفة لتعويض الجرعات المنسية.

## الآثار التي قد تحدث عند إنهاء العلاج بـ ETOTiO:

للحصول على معلومات مفصلة حول الآثار التي قد تحدث عند إنهاء العلاج بـ ETOTiO، استشر طبيبك.

## ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

مثل جميع الأدوية، قد تحدث آثار جانبية لدى الأشخاص الذين لديهم حساسية للمواد الموجودة في ETOTiO.

إذا حدث أي مما يلي، توقف عن استخدام ETOTiO وأبلغ طبيبك فورًا أو اذهب إلى أقرب قسم طوارئ في المستشفى:

ألم شديد في المعدة أو الظهر،

قرحة شديدة في المعدة أو نزيف (يزيد تناول جرعات عالية أو لفترة طويلة، التدخين أو شرب الكحول من خطر حدوث هذه الآثار الجانبية. تناول الدواء مع الطعام لا يقلل من خطر حدوث هذه الآثار)،

اسوداد لون البراز (ميلينا)، قيء دموي أو يشبه حبيبات القهوة (قد تكون هذه الأعراض علامة على نزيف في الجهاز الهضمي)،

زيادة غير عادية في الوزن أو تورم،

ردود فعل تحسسية شديدة (طفح جلدي، شرى، حكة، صعوبة في التنفس، ضيق في الصدر، تورم في الفم، الوجه، الشفتين أو اللسان)،

سكتة دماغية،

ألم في الصدر،

نبضات قلب سريعة أو غير منتظمة.

تورم اليدين، القدمين، الكاحلين، الوجه، الشفتين، أو تورم الفم أو الحلق مما يجعل البلع أو التنفس صعبًا.  
حكة، تورم على الجلد والأغشية المخاطية (وذمة وعائية عصبية)، ردود فعل تحسسية شديدة (صدمة تأقية).  
الشرى (طفح جلدي).

إغماء (إغماء وعائي مبهمي).

تشنجات (نوبات) (انظر القسم 2 "ما يجب معرفته قبل استخدام ETOTiO")،

انخفاض ضغط الدم (انخفاض ضغط الدم)، اضطراب مؤقت في الوعي.

كل هذه آثار جانبية خطيرة جدًا.

إذا كان أي من هذه موجودًا لديك، فهذا يعني أن لديك حساسية شديدة تجاه ETOTiO. قد تحتاج إلى تدخل طبي عاجل أو دخول المستشفى.

**إذا لاحظت أيًا مما يلي، أبلغ طبيبك فورًا أو اذهب إلى أقرب قسم طوارئ في المستشفى:**

التهاب الكبد (انظر القسم 2 "ما يجب معرفته قبل استخدام ETOTiO")،

ألم أو عدم راحة في منطقة المعدة (البطن)، فقدان الشهية، غثيان، قيء، اصفرار الجلد أو بياض العينين (اليرقان)، بول أغمق من المعتاد، حكة، حمى وتعب (قد تكون هذه علامات على مشاكل في الكبد).

نعاس، حالة من الخمول.

حكة.

طفح جلدي.

كل هذه آثار جانبية خطيرة. قد تتطلب تدخلًا طبيًا عاجلاً.

تم تصنيف الآثار الجانبية على النحو التالي: شائع جدًا: يمكن ملاحظته في مريض واحد على الأقل من كل 10 مرضى. شائع: يمكن ملاحظته في مريض واحد من كل 10 مرضى، ولكن في أكثر من مريض واحد من كل 100 مريض. غير شائع: يمكن ملاحظته في أقل من مريض واحد من كل 1000 مريض، ولكن في أكثر من مريض واحد من كل 1000 مريض. نادر: يمكن ملاحظته في أقل من مريض واحد من كل 10000 مريض، ولكن في أكثر من مريض واحد من كل 10000 مريض. نادر جدًا: يمكن ملاحظته في أقل من مريض واحد من كل 10000 مريض. غير معروف: لا يمكن تقدير التكرار من البيانات المتاحة.

#### شائعة

تعب

دوخة

اكتئاب نفسي

عصبية

رؤية ضبابية

طنين الأذن

عسر الهضم (dyspepsia)

ألم في البطن

إسهال

غازات في الأمعاء

غثيان

إمساك

التهاب المعدة

إسهال، ألم في المعدة (gastralgia)

براز أسود

قيء

حكة

طفح جلدي

تبول مؤلم

كثرة التبول

قشعريرة وحمى

اضطرابات حسية مثل التتميل، الوخز أو الإحساس بالحرقان (تمثل)

حالة نوم ملحوظة بفقدان الوعي؛ نعاس (somnia)

### غير شائعة

كدمات على الجلد

فقر الدم

نقص الصفائح الدموية في الدم

زيادة في وقت النزيف

انخفاض في قيم خلايا الدم البيضاء وخلايا الدم الحمراء

فقر الدم الناتج عن تدمير كريات الدم الحمراء (فقر الدم الانحلالي)

وذمة

زيادة في كرياتينين المصل، وهو قيمة تشير إلى وظائف الكلى

ارتفاع سكر الدم لدى مرضى السكري الذين كانوا تحت السيطرة سابقًا

تغير في وزن الجسم

اضطراب حاسة التذوق

الأرق

اضطراب الوعي

ارتباك

حساسية للضوء

اضطراب مؤقت في الرؤية

التهاب داخل العين

صمم

ارتفاع ضغط الدم

فشل القلب الاحتقاني

احمرار الوجه

خفقان

إغماء

التهاب الأوعية الدموية

اضطراب نظم القلب

نوبة قلبية

تلف الدماغ بسبب انسداد الأوعية الدموية الدماغية

ربو

وذمة رئوية (تسلل رئوي) مصحوبة بارتفاع خلايا الدم البيضاء (فرط الحمضات)

التهاب الشعب الهوائية

ضيق التنفس

التهاب البلعوم

نزلة برد

التهاب الجيوب الأنفية (الجيوب الأنفية المملوءة بالهواء حول الأنف، الصدغ، الجبهة والعينين)

عطش

جفاف الفم

تقرحات الفم

اضطراب الأكل

تجشؤ

التهاب الأمعاء الدقيقة

قرحة و/أو انتقاب في المعدة، مع أو بدون نزيف

قرحة في الأمعاء

التهاب البنكرياس

التهاب المريء، مصحوبًا بتقلص أو تضيق العضلة بين المريء والمعدة، أو التهاب المريء وحده

التهاب القولون الغليظ

ارتفاع إنزيمات الكبد

التهاب الكبد الناجم عن القناة الصفراوية (التهاب الكبد)

التهاب الكبد

اليرقان الناجم عن القناة الصفراوية

يرقان

فشل الكبد

تلف الكبد

وذمة منتشرة في الجلد

تعرق

تفاعلات جلدية تحسسية

طفح جلدي

تقشير الجلد

طفح جلدي مصحوب بظهور بثور على الجلد

التهاب الأوعية الدموية في الجلد مع طفح جلدي أحمر بارز

مرض جلدي مصحوب باحمرار مؤلم أو أرجواني وبثور في الجلد (متلازمة ستيفنز جونسون)

مرض جلدي مهدد للحياة يتميز بظهور بثور وتقشير الجلد (انحلال البشرة السمي)

مرض جلدي يسبب احمرار وبثور وتقرحات في الفم والعينين والمنطقة التناسلية (متعدد الأشكال الحمامي)

اسوداد لون الجلد

تساقط الشعر

طفح جلدي أحمر منتشر، مسطح في بعض المناطق ومرتفع عن الجلد في مناطق أخرى (طفح حطاطي بقعي)

حساسية للصوء

زيادة في نيتروجين اليوريا في الدم

فشل كلوي

خلل في وظائف الكلى

تلف خلايا الكلى

التهاب المثانة

دم في البول

حصوات الكلى

التهاب الكلى

اضطرابات نزيف الرحم

تفاعلات فرط الحساسية

تفاعلات تحسسية شديدة (بما في ذلك الصدمة) تبدأ فجأة وقد تؤدي إلى الوفاة، مصحوبة بأعراض مثل الاحمرار العام، الحكّة، تورم الحلق وانخفاض ضغط الدم

صداع

حالة مرضية تنشأ عن دخول ميكروبات أو طفيليات مسببة للمرض إلى الجسم (عدوى)

#### نادرة

تهيج الجلد (شرى)

ألم وحرقة في الحلق، الصدر والمعدة (حموضة المعدة).

إذا واجهت أي آثار جانبية لم تذكر في هذه النشرة، يرجى إبلاغ طبيبك أو الصيدلي.

#### الإبلاغ عن الآثار الجانبية

في حال حدوث أي أثر جانبي، سواء كان مذكورًا في نشرة الاستخدام أم لا، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة. يمكنك أيضًا الإبلاغ عن الآثار الجانبية التي تواجهها عن طريق النقر على أيقونة "الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية" الموجودة على الموقع الإلكتروني [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) أو عن طريق الاتصال بخط الإبلاغ عن الآثار الجانبية على الرقم 0 800 314 800 إلى المركز التركي للمراقبة الدوائية (TÜFAM). من خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية، ستساهم في توفير المزيد من المعلومات حول سلامة الدواء الذي تستخدمه.

تخزين ETOTİO

احفظ ETOTÍO بعيدًا عن متناول الأطفال ومرآهم، وفي عبوته الأصلية.  
احفظه في درجة حرارة الغرفة أقل من 25 درجة مئوية وفي عبوته الأصلية.

### استخدمه وفقًا لتاريخ انتهاء الصلاحية.

لا تستخدم ETOTÍO بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على العبوة.

لا تتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية أو غير المستخدمة في سلة المهملات! قم بتسليمها إلى نظام التجميع المحدد من قبل وزارة البيئة والتخطيط العمراني.

إذا لاحظت أي عيوب في المنتج و/أو عبوته، فلا تستخدم ETOTÍO.

#### صاحب الترخيص:

.Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş  
İş Kuleleri, Levent Mah., Meltem Sok. No: 10 Kule: 2 Kat: 24 4. Levent, Beşiktaş, İstanbul  
الهاتف: 00 38 337 0212

#### مكان التصنيع:

.Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş  
Sanayi Cad. No:13 Yenibosna, Bahçelievler/İstanbul

تمت الموافقة على هذه النشرة في 24/06/2021.