

ALDACTONE 100 ملغ أقراص

يؤخذ عن طريق الفم

سبيرونولاكتون

مدر للبول

يُصرف بوصفة طبية

المادة الفعالة

يحتوي كل قرص على 100 ملغ من سبيرونولاكتون.

المواد المساعدة

ثنائي هيدرات كبريتات الكالسيوم، نشا الذرة، PVP K-30، ستيرات المغنيسيوم، نكهة النعناع Felcofix
الشكل الصيدلاني

أقراص بيضاء مستديرة برائحة النعناع، وعليها كلمة "SEARLE" على أحد الجانبين، متوفرة في عبوات بليستر تحتوي على 16 قرصاً.

اقرأ نشرة معلومات المريض هذه بعناية قبل البدء في استخدام هذا الدواء، لأنها تحتوي على معلومات مهمة لك.

احتفظ بنشرة معلومات المريض هذه. قد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى.

إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية، يرجى استشارة طبيبك أو الصيدلي.

لقد وُصف هذا الدواء خصيصاً لك، لا تعطه للآخرين.

أثناء استخدام هذا الدواء، أخبر طبيبك أنك تستخدمه عند زيارة الطبيب أو المستشفى.

اتبع التعليمات المكتوبة في هذه النشرة بدقة. لا تستخدم جرعة أعلى أو أقل من الجرعة الموصى بها لك.

في نشرة معلومات المريض هذه

1. ما هو ALDACTONE وما هي دواعي استخدامه؟

2. ما الذي يجب مراعاته قبل استخدام ALDACTONE؟

3. كيف يستخدم ALDACTONE؟

4. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

5. كيفية تخزين ALDACTONE؟

ما هو ALDACTONE وما هي دواعي استخدامه؟

ALDACTONE ينتمي إلى مجموعة الأدوية المدرة للبول. يتوفر ALDACTONE على شكل أقراص بيضاء مستديرة برائحة النعناع، وعليها كلمة "SEARLE" على أحد الجانبين، في عبوات بليستر تحتوي على 16 قرصاً.

إذا كان لديك تورم في الكاحلين أو ضيق في التنفس، قم بزيارة الطبيب. قد يكون هذا بسبب ضعف في قوة ضخ قلبك عندما يكون هناك سائل زائد في جسمك. يُعرف هذا باسم قصور القلب الاحتقاني. تدوير السائل الزائد في جسمك يعني أن قلبك يجب أن يعمل بجهد أكبر. سيعطيك طبيبك ALDACTONE للمساعدة في التخلص من السوائل الزائدة من جسمك. عندما تستخدم ALDACTONE، ستشعر بالحاجة إلى الذهاب إلى المرحاض أكثر. وبهذه الطريقة، ستخلص من السائل الزائد عن طريق البول.

يستخدم ALDACTONE أيضاً في علاج الحالات التالية:

ارتفاع ضغط الدم الأساسي (ارتفاع ضغط الدم غير معروف السبب)

المتلازمة الكلوية (مرض كلوي يؤدي إلى تراكم الكثير من السوائل في الجسم)

الاستسقاء (تراكم السوائل في البطن، على سبيل المثال بسبب تليف الكبد)

فرط الألدوستيرونية الأولي (تراكم السوائل في الجسم بسبب ارتفاع مستويات هرمون الألدوستيرون)

نقص بوتاسيوم الدم / نقص مغنيسيوم الدم مع مدرات البول (انخفاض مستوى البوتاسيوم في الدم عن المعدل الطبيعي) في العلاج المركب

علاج كثرة الشعر (نمو الشعر الزائد)

ما الذي يجب مراعاته قبل استخدام ALDACTONE؟

لا تستخدم ALDACTONE في الحالات التالية:

إذا كنت:

لديك حساسية مفرطة تجاه سيبرونولاكتون أو أي من السواغات.

مصاب بمرض أديسون (حالة لا تعمل فيها الغدد الكظرية بشكل صحيح).

كان لديك رد فعل غير عادي أو تحسسي تجاه سيبرونولاكتون في الماضي.

تعاني من فرط بوتاسيوم الدم (ارتفاع مستوى البوتاسيوم في الدم).

غير قادر على التبول.

تعاني من مرض كلوي شديد.

ترضعين رضاعة طبيعية.

تستخدم إيليرينون (يستخدم لقصور القلب المزمن).

تستخدم أقراص مدرة للبول موفرة للبوتاسيوم أو أقراص مكملات البوتاسيوم.

لا يجب على الأطفال المصابين بمرض كلوي متوسط إلى شديد استخدام ALDACTONE.

استخدم ALDACTONE بحذر في الحالات التالية:

إذا كنت:

تعاني من مرض كلوي خطير؛ خاصة إذا كان هناك مرض كلوي لدى الأطفال المصابين بأمراض الكبد أو ارتفاع ضغط الدم، تحدث مع طبيبك حول هذه الحالة. قد يطلب طبيبك

إجراء تقييم روتيني، خاصة إذا كنت من الفئة العمرية الكبيرة.

حامل.

تعاني من صعوبة في التبول.

تعاني من قصور حاد في القلب.

تعاني من مرض يتسبب في عدم توازن الكهارل في دمك، مثل الصوديوم والبوتاسيوم.

تستخدم ALDACTONE مع أقراص مدرة للبول أخرى قد تسبب انخفاض مستوى الصوديوم في الدم (نقص صوديوم الدم)، فكن حذرًا.

إذا كان لديك انخفاض في وظائف الكلى أو قصور كلوي، فقد تحدث زيادات خطيرة في مستوى البوتاسيوم في دمك. قد يؤثر هذا على وظائف قلبك وقد تكون له عواقب مميتة

في الحالات القصوى.

قد يؤدي استخدام الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم وبعض الأدوية مثل مكملات البوتاسيوم مع ALDACTONE إلى فرط بوتاسيوم الدم الشديد (زيادة البوتاسيوم في الدم). قد

تشمل أعراض فرط بوتاسيوم الدم الشديد تشنجات العضلات، وعدم انتظام ضربات القلب، والإسهال، والغثيان، والدوار، والصداع.

استخدام ALDACTONE مع الطعام والشراب

يجب تناول ALDACTONE مع الطعام. لا ينبغي استخدامه مع الكحول.

الحمل

استشر طبيبك أو الصيدلي قبل تناول الدواء.

إذا كنت حاملاً، أو تعتقدين أنك قد تكونين حاملاً أو تخططين للحمل، أخبري طبيبك. يمكنك استخدام ALDACTONE إذا رأى طبيبك ذلك ضرورياً. إذا لاحظت أنك حامل أثناء العلاج، استشري طبيبك أو الصيدلي على الفور.

الرضاعة الطبيعية

استشر طبيبك أو الصيدلي قبل تناول الدواء.

لا تستخدم ALDACTONE إذا كنت ترضعين رضاعة طبيعية.

إذا كنت ترضعين رضاعة طبيعية وتحتاجين إلى استخدام ALDACTONE، استشري طبيبك لتحديد طريقة بديلة لتغذية الرضيع.

القيادة واستخدام الآلات

أبلغ عن حدوث نعاس ودوار لدى بعض المرضى الذين يتلقون علاج ALDACTONE. لذلك، قد يؤثر ALDACTONE على القدرة على قيادة المركبات واستخدام الآلات. يجب توخي الحذر عند القيادة أو تشغيل الآلات.

معلومات مهمة حول بعض السواغات الموجودة في ALDACTONE

إذا لم تكن لديك حساسية مفرطة تجاه السواغات الموجودة في ALDACTONE، فلا يتوقع حدوث أي آثار جانبية سلبية مرتبطة بهذه المواد. لا يحتوي على أي سواغات تتطلب تحذيراً.

الاستخدام مع أدوية أخرى

إذا كنت ستخضع لعملية جراحية تتطلب تحذيراً، أخبر طبيبك أنك تستخدم ALDACTONE.

قد يحتاج طبيبك إلى تعديل جرعة ALDACTONE إذا كنت تتناول أحد الأدوية التالية:

ديجوكسين المستخدم لعلاج أمراض القلب أو كاربينوكسولون المستخدم في اضطرابات الجهاز الهضمي.

الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم (مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين).

مدرات البول الأخرى (مثل مدرات البول الموفرة للبوتاسيوم).

الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs) مثل حمض أسيتيل ساليسيليك، إندوميثاسين، حمض ميفيناميك، أو إيبوبروفين المستخدمة كمضادات للالتهابات. مكملات البوتاسيوم.

الهيبارين أو الهيبارين منخفض الوزن الجزيئي المستخدم لمنع تجلط الدم.

أنتيبيرين المستخدم كمسكن للألم وخافض للحرارة.

الأدوية المعروفة بأنها تسبب فرط بوتاسيوم الدم (ارتفاع مستوى البوتاسيوم في الدم).

تريميثوبريم وتريميثوبريم-سلفوميثوكسازول المستخدمة كمضادات للعدوى.

الليثيوم المستخدم في علاج اضطرابات المزاج.

توبوكورارين، المستخدم كمرخي للعضلات المخططة أثناء تشخيص بعض الأمراض والإجراءات الجراحية/غير الجراحية.

الكورتيكوستيرويدات، المستخدمة كمضادات للالتهابات ومنظمات للجهاز المناعي.

الكحول، الباربيتورات، المخدرات التي يمكن أن تسبب انخفاض ضغط الدم عند استخدامها معاً.

يقلل ALDACTONE من استجابة الجسم للنور أدرينالين. إذا كنت ستخضع لعملية جراحية تتطلب تحذيراً، أخبر طبيبك بذلك.

إذا كنت تستخدم أبيتريون لعلاج سرطان البروستاتا، أخبر طبيبك.

إذا كنت تستخدم حالياً أو استخدمت مؤخراً أي دواء بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية، يرجى إبلاغ طبيبك أو الصيدلي بذلك.

كيف يستخدم ALDACTONE؟

تعليمات الاستخدام المناسب والجرعة / تكرار الاستخدام:

اتبع هذه التعليمات ما لم يوصي طبيبك أو الصيدلي بخلاف ذلك.

سيقرر طبيبك كمية ALDACTONE التي تحتاجها. هذه الكمية متغيرة، وسيقوم طبيبك بتعديل الجرعة المناسبة لك. للبالغين، يمكن إعطاؤه كجرعة واحدة يومياً أو بجرعات مقسمة. يجب تناوله مع الطعام.

قد تتراوح جرعة البالغين من 25 إلى 200 ملغ من سبيرونولاكتون يومياً. إذا لم تكن متأكدًا من الكمية التي يجب تناولها، استشر طبيبك أو الصيدلي.

طريقة التطبيق:

يؤخذ ALDACTONE عن طريق الفم.

الفئات العمرية المختلفة:

الاستخدام في الأطفال:

إذا كنت ستعطي هذا الدواء للأطفال، فإن عدد الأقراص التي ستعطيها يعتمد على وزن الطفل. سيبلغك طبيبك بعدد الأقراص التي يجب إعطاؤها.

الاستخدام في كبار السن:

سيبدأ طبيبك العلاج بجرعة منخفضة لك وسيقوم بزيادة جرعتك تدريجياً حتى يتم تحقيق التأثير المطلوب.

حالات الاستخدام الخاصة:

الفشل الكلوي:

لا ينبغي استخدامه في حالات الفشل الكلوي الحاد، أو تدهور وظائف الكلى، أو ضعف شديد في وظائف الكلى.

الفشل الكبدي:

يجب توخي الحذر في حالات الفشل الكبدي الشديد الذي قد يغير عملية استقلاب الدواء وإفرازه.

إذا كان لديك انطباع بأن تأثير ALDACTONE قوي جداً أو ضعيف جداً، تحدث مع طبيبك أو الصيدلي.

إذا استخدمت كمية أكبر مما يجب من ALDACTONE:

تحدث إلى طبيب أو صيدلي إذا كنت قد استخدمت كمية أكبر مما يجب من ALDACTONE.

تشمل أعراض الجرعة الزائدة الشعور بالغثاس، والدوار، والغثاس، والتعب، وقد تشعر بالارتباك. قد تعاني من الإسهال أو طفح جلدي على شكل نتوءات صغيرة أو مناطق حمراء مسطحة منتشرة على الجلد. قد تسبب التغيرات في مستويات الصوديوم والبوتاسيوم في الدم شعوراً بالتعب وقد تعاني من وخز أو ألم أو خدر في جلدك و/أو تشنجات عضلية. ومع ذلك، لا يمكن القول إن هذه الأعراض مرتبطة بجرعة زائدة خطيرة.

إذا نسيت استخدام ALDACTONE

إذا نسيت تناول جرعتك، فتناولها بمجرد أن تتذكرها، ما لم يكن قد حان وقت الجرعة التالية.

لا تتناول جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية.

الآثار التي قد تحدث عند إيقاف العلاج بـ ALDACTONE

استمر في تناول الدواء حتى يخبرك طبيبك بالتوقف، حتى لو شعرت بتحسن.

إذا توقفت عن استخدام الدواء قبل المدة المحددة، فقد تسوء حالتك. إذا كانت لديك أسئلة حول استخدام الدواء، استشر طبيبك.

ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

مثل جميع الأدوية، قد تحدث آثار جانبية لدى الأشخاص الذين لديهم حساسية للمواد الموجودة في ALDACTONE.

تم تصنيف الآثار الجانبية على النحو التالي:

شائعة جدًا: قد تظهر لدى 1 من كل 10 مرضى على الأقل.

شائعة: قد تظهر لدى أقل من 1 من كل 10 مرضى، ولكن أكثر من 1 من كل 100 مريض.

غير شائعة: قد تظهر لدى أقل من 1 من كل 100 مريض، ولكن أكثر من 1 من كل 1000 مريض.

نادرة: قد تظهر لدى أقل من 1 من كل 1000 مريض.

نادرة جدًا: قد تظهر لدى أقل من 1 من كل 10000 مريض، ولكن أكثر من 1 من كل 10000 مريض.

غير معروفة: لا يمكن تقديرها من البيانات المتاحة.

إذا حدث أي مما يلي، توقف عن استخدام ALDACTONE وأبلغ طبيبك فورًا أو اذهب إلى أقرب قسم طوارئ في المستشفى:

غير معروف:

حكة ونوبات على الشفاه وأجزاء أخرى من الجسم (متلازمة ستيفنز جونسون).

انفصال الطبقات العليا من الجلد عن الطبقات السفلية في جميع أنحاء الجسم (انحلال البشرة السمي).

طفح جلدي، حمى، وذمة (قد تكون علامات على حالة أكثر خطورة، طفح دوائي، فرط الحمضات، وأعراض جهازية).

اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)، قد يسبب ALDACTONE خللاً في وظائف الكبد.

عدم انتظام ضربات القلب (قد يكون مميتًا)، إحساس بالوخز، فقدان وظيفة العضلات (الشلل) أو صعوبة في التنفس؛ قد تكون هذه علامات على ارتفاع مستوى البوتاسيوم في الدم. سيطلب طبيبك إجراء فحوصات دم منتظمة لمراقبة مستويات البوتاسيوم والكهارل الأخرى. قد ينهي علاجك إذا رأى ذلك ضروريًا.

كل هذه آثار جانبية خطيرة جدًا. إذا كان أي منها موجودًا لديك، فقد تحتاج إلى تدخل طبي عاجل أو دخول المستشفى.

إذا لاحظت أيًا مما يلي، أخبر طبيبك:

غير معروف:

غثيان، اضطراب في المعدة،

نعاس، دوام،

مشاكل تتعلق بالدورة الشهرية لدى النساء،

تغير في الرغبة الجنسية (الرغبة الجنسية) لدى الرجال والنساء،

عدم انتظام الكهارل في الجسم (ارتفاع الكالسيوم في الدم)،

انخفاض عدد الخلايا المقاومة للعدوى (قلة الكريات البيض)؛ انخفاض عدد خلايا الدم التي تسبب تخثر الدم (نقص الصفائح)،

تضخم الثدي لدى الرجال (التثدي)؛ نزول هذه الحالة عند إيقاف العلاج؛ كتل في الثدي، ألم في الثدي،

خشونة الصوت لدى النساء،

احمرار الجلد، حكة عامة،

حساسية الجلد مع ظهور الشرى والحكة؛ نمو الشعر الزائد (فرط الشعر)،

تساقط الشعر،

تعب عام، تشنجات في العضلات والساقين،

فشل كلوي مفاجئ أو وظائف كبد غير طبيعية،

ارتفاع مستوى البوتاسيوم في الدم (فرط بوتاسيوم الدم)،

فقاع (مرض جلدي يتميز بتكوين فقاعات مملوءة بالماء على الجلد، وتكوين قشور وتقرحات سطحية بعد انفجار الفقاعات).

هذه هي الآثار الجانبية الخفيفة لـ ALDACTONE.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية

إذا تعرضت لأي آثار جانبية مذكورة أو غير مذكورة في نشرة معلومات المريض هذه، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة. يمكنك أيضًا الإبلاغ عن الآثار الجانبية التي تواجهها إلى المركز التركي لليقظة الدوائية (TÜFAM) عن طريق النقر على أيقونة "الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية" على الموقع الإلكتروني www.titck.gov.tr أو الاتصال بخط الإبلاغ عن الآثار الجانبية على الرقم 08 00 314 800 0. من خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية، ستساهم في الحصول على مزيد من المعلومات حول سلامة الدواء الذي تستخدمه.

كيفية تخزين ALDACTONE؟

احفظ ALDACTONE بعيدًا عن رؤية ومتناول أيدي الأطفال وفي عبوته الأصلية.

احفظه في درجة حرارة الغرفة أقل من 30 درجة مئوية.

احفظه في عبوته الأصلية.

استخدمه وفقًا لتاريخ انتهاء الصلاحية

لا تستخدم ALDACTONE بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على العبوة.

لا تتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية أو غير المستخدمة في سلة المهملات! قم بتسليمها إلى نظام التجميع المحدد من قبل وزارة البيئة والتخطيط العمراني.

صاحب ترخيص التسويق

.ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş.

كاغيثانه/اسطنبول

مكان التصنيع

.ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş.

باشاك شهير/اسطنبول

تمت الموافقة على نشرة معلومات المريض هذه بتاريخ.